

DIE VERBREITUNG VON AMPHIPYRA BERBERA RUNGS,
1949 (LEP.: NOCTUIDAE) IN UNGARN
(Auszug)

Die Art *Amphipyra berbera Rungs* ist im Karpatenbecken — besonders im den Waldgebieten des ungarischen Mittelgebirges — ziemlich verbreitet. Die unterschiedliche Häufigkeit der beiden Arten *A. pyramidea* L. und *A. berbera Rungs* in Európa können unserer Meinung nach dadurch erklärt werden, daß die beiden Arten nicht in gleichem Maße den anthropogenen Bedingungen angepaßt sind. Während *A. pyramidea*, deren Raupe auch auf Obstbäumen lebt und deren Falter sich während der Aestivation gern in menschlichen Bauten verbirgt, als eine Kulturfolger-Art zu betrachten ist, gilt *A. berbera* vielmehr als ein Waldtier und in der Kulturlandschaft scheint sie wesentlich seltener vorzukommen. In der Arbeit werden auch die äußeren morphologischen Differenzen sowie die Genitalunterschiede der Falter, schließlich auch die Verschiedenheit der Raupen beider Arten dargestellt bzw. beschrieben und eine Zusammenstellung der Verbreitungsangaben der *A. berbera Rungs* im Karpatenbecken mitgeteilt (S. Verbreitungskarten).

ZOLTÁN VARGA