

Melizophilus rothschildi n. sp.

M. melanocephalus (Gmel.)-hoz hasonló, de valamivel kisebb: háta világos szürke, barna fuvalattal; alul fehér, melle, oldalai és alsó farkfedői világos fakó-barnával árnyaltak; csöre sötét szarúbarna, alsó kávájának töve fehéres; lábai világos sárgás-barnák.

E faj, melyet *Rothschild* Walter báró tiszteletére nevezek el, úgy látszik a *M. melanocephalus* (Gmel.) és a *M. blanfordi* (Seeb.) között áll. Színezetére nézve ugyan közelebb áll ez utóbbihoz, de világos sárgás-barna lábai és szárnyevezőinek aránya az előbbiével egyezik.

Ez új faj felállításánál bárom példány állott rendelkezésemre s ezek közül kettő (decemberi és márciusi példány) egymással teljesen megegyező, míg a harmadik (májusi példány) fölül világos szürke; alig észrevehető barnás fuvalattal, alul pedig tiszta fehér, minden barnás árnyalat nélkül: ezen eltérés azonban esakis a tollak elkopásának tulajdonítható.

Példányaink, melyek a Magy. Nemz. Muzeum tulajdonát képezik, következők:

1. ♂ ad. Aim-Feschha, 1897 deez. 6.

Hossza kb. 13, szárnya 5·4, farka 6·3. csöre 1, csüdje 1·9 cm. (Az első evező 0·5 cm-rel haladja túl az elsőrendű evezőknek megfelelő fedőtollakat; a 2-dik a 7-dik és 8-dik között áll.)

2. ♂ ad. Jeruzsalem, 1900 március 15.

Hossza kb. 13·2, szárnya 5·6, farka 6·4, csöre 1, csüdje 1·9 cm. (Az első evező 0·4 cm.-rel haladja túl az elsőrendű evezőknek megfelelő fedőtollakat; a 2-dik egyenlő a 7-dikkkel.)

3. ♂ ad. Jericho, 1896 máj. 5.

Hossza kb. 13·3, szárnya 5·5 farka 6, csöre 1, csüdje 1·9 cm. (Az első evező 0·4 cm.-rel haladja túl az elsőrendű evezőknek megfelelő fedőtolla-
kat; a 2-dik a 7-dik és 8-dik között áll.)

Dr. Madarász Gyula.

Melizophilus rothschildi n. sp.

Dem *M. melanocephalus* (Gmel.) ähnlich, jedoch etwas kleiner. Rücken hell grau mit braun überflogen: unten weiss: Brust, Seiten und mittlere Schwanzdeckfedern hell fahlbraun angehaucht: Schnabel dunkel Hornbraun, am Grunde des Unterkiefers weisslich: Füsse hell gelblichbraun.

Die Art, welche ich mir zu Ehren des Herrn Hon. *Walter Rothschild* zu benennen erlaube, steht anscheinlich zwischen *M. melanocephalus* (GMEL.) und *M. blanfordi* (SEEB.). Der Färbung nach steht sie zwar der letzteren näher, aber die hell gelblichbraune Farbe der Füsse und das Verhältniss der Schwingen entspricht der erstgenannten Art.

Bei Aufstellung dieser Art standen mir drei Exemplare zu Gebote, von welchen zwei (December- und März-Exemplare) einander vollkommen entsprechen, während das dritte (in Mai erlegte) oben hell grau ist, mit kaum wahrnehmbaren bräunlichen Anflug; unten aber rein weiss, ohne allen bräunlichen Thon; dieser Unterschied ist aber nur der Abreibung der Federn zuzuschreiben.

Im Besitze des Ungar. National Museums befinden sich folgende Exemplare:

1. ♂ ad. Ain-Feschha, 6. December 1897.

Tot. Länge circa 13, Flügel 5·4, Schwanz 6·3, Schnabel 1, Tarsus 1·9 Cm. (Die erste Schwinge übertrifft mit 0·5 Cm. die Deckfedern erster Ordnung; die zweite Schwinge steht zwischen der 7-ten und 8-ten.)

2. ♂ ad. Jerusalem, 15. März 1900.

Tot. Länge circa 13·2, Flügel 5·6, Schwanz 6·4, Schnabel 1, Tarsus 1·9 Cm. (Die erste Schwinge übertrifft mit 0·4 Cm. die Deckfedern erster Ordnung; die zweite Schwinge gleich mit der 7-ten).

3. ♂ ad. Jericho, 5. Mai 1896.

Tot. Länge circa 13·3, Flügel 5·5, Schwanz 6, Schnabel 1, Tarsus 1·9 Cm. (Die erste Schwinge übertrifft mit 0·4 Cm. die Deckfedern erster Ordnung; die zweite Schwinge steht zwischen der 7-ten und 8-ten.)

Dr. Julius von Madarász.

(*Separatim editum est die 20. Junii 1901.*)