

ENDOMYCHIDEN UND EROTYLIDEN AUS CEYLON.

GESAMMELT VON Dr. WALTHER HORN.

VON ERNEST CSIKI.

Endomychidae.**Eumorphus** WEBER.*pulchripes* GERST. — Matala, Kandy.**Saula** GERST.*ferruginea* GERST. — Puttalam.*nigripes* GERST. — Kandy.**Stenotarsoides** CSIKI.*Nictneri* GERST. — Weligama.*tomentosus* GERST. — Paradna, Weligama. Mir liegt von dieser Art auch ein Exemplar aus Kalawewa vor, welches Dr. J. MADARÁSZ am 10. Februar 1896 sammelte.*callatus* GERST. — Kandy, Nalanda. GORHAM erwähnt diese von Dickoya, wo sie LEWIS sammelte (Proc. Zool. Soc. London, 1886, p. 161).*russatus* GORH. — Bandarawella. Wurde von GORHAM (Proc. Zool. Soc. London, 1886, p. 161) nach einem Exemplar beschrieben, dessen näherer Fundort nicht bekannt war.**Erotylidae.****Episcaphula** CROUCH.*singalensis* n. sp.

Länglich oval, schwarz, schwach glänzend, Flügeldecken mit zwei rothgelben Querbänden. Fühler bis zur Basis der Flügeldecken reichend; das dritte Fühlerglied fast doppelt so lang als das zweite, das 4–8. Glied von gleicher Länge, kürzer als das dritte; Fühlerkeule lose gegliedert, die Glieder gross und breit, sehr fein, aber dicht gelb behaart. Kopf und Hals-

schild ziemlich stark zerstreut punktiert. Flügeldecken mit sieben Punktstreifen, Zwischenräume fein punktiert. Von den zwei rothgelben Querbinden der Flügeldecken, liegt die eine gleich hinter der Basis, die zweite im letzten Viertel vor der Spitze; die Binden reichen nach Aussen nur bis zum schmal aufgebogenen Seitenrand, die Vordere ist auch an der Naht unterbrochen und sendet in der äussern Hälfte zwei fast bis zur Basis reichende Spitzen aus. Unterseite pechschwarz: Vorderbrust stark, Mittel- und Hinterbrust feiner und weniger tief, Abdomen ganz fein punktiert und gelblichweiss zerstreut behaart: die Aussenseite der Tibien und die Tarsenglieder oben dicht behaart. Länge 7—7.5 mm.

Diese neue Art gehört in die Verwandtschaft der *Episcaphula andamanuensis* GORH. und wurde von Herrn Dr. WALTHER HORN bei Anuradhapura auf Ceylon entdeckt.

Episcapha LACORD.

quadrinacula WIEDM. = Kandy, Anuradhapura.

Amblyopus LACORD.

cinclipennis LACORD. Matala, Kandy, Paradna, Anuradhapura.

cittatus OLIV. = Kandy. Ein unausgefärbtes, von der Stammform etwas abweichendes Exemplar mit in der Mitte unterbrochener Längsbinde.

★

Anmerkung. — Herr Dr. WALTHER HORN war so freundlich, von oben aufgeführten Arten Belegstücke dem Ung. National-Museum zu überlassen.

(Separatim editum est die 1. Decembris 1901.)