

azonban, hogy az bizony *Cossus*, mely itt, a hol sok az öreg fűz- és gyümölcsfa, elég gyakori. Újra kiment s újra hozott néhány példányt. A dolog kezdett engem érdekelni, magam is kimentem, de mihelyt a lámpással közelegettem, a méhesnél röpködő állatok nyilsebességgel tovaszálltak, azonban csakhamar visszatértek, a mint a lámpást eloltottam s így fiaimmal az este 33 *Cossust* fogtam, melyek közül 19 használhatót megtartottam, a többi kopottat pedig eleresztettem. Azt fájdalom, meg nem figyeltem, vajon a méhkasba behataltak-e, vagy legalább igyekeztek bejutni, mi által a méheket nyugtalanították volna, annyi időt nem engedtünk nekik. Ha azonban fontolóra vesszük, hogy augusztus 24-én a közel erdőben egy *Cossus* a csalétekre jött, azon a Noctuák módjára kitarított s cyanüveggel el is fogatta magát, közel fekszik annak a feltevése, hogy a fentebb említett 33 *Cossust* is a méz illata vonzotta oda, és hogy a méhkasok platonikus szemlélésével meg nem elégedtek volna, hogyha vállalkozásukban kiméletlenül meg nem akadályozzuk. Így azonban a mézre való sovárgásuknak ugyancsak drágán adták meg az árát.

Cerva Frigyes.

Hány petét rak a méhkirályné? Egy palesztinai méhtenyésztő megfigyelte egész éven át mennyit petézik a méhkirályné s a következő eredményre jutott: Jan. 1-től Jan. 20-ig naponként 100 drb, febr. 6-ig 666, márcz. 3-ig. 700, márcz. 18-ig 2333, april 10-ig 2600, máj. 21-ig 1000, jun. 11-ig 2111, jul. 10-ig 2277, aug. 3-ig 1250, aug. 29-ig 460, sept. 13-ig 200, okt. 14-ig 115, nov. 11-ig 35, dec. 10-ig naponként 28 darabot, összesen egy év lefolyása alatt 320 ezer petét. Látnivaló, hogy számuk nagyon változó, áprilig folyton növekvő, akkor hirtelen alászáll, június-júliusban ismét emelkedik s az év vége felé mindinkább csökken, de a királyné csak 20 napig egészen tétlen.

A repcebogár (*Meligethes brassicae* Sc.), melyet népünk a fénybogár- vagy rézbogárnak is nevez, álca alakban nagyon gyakran pusztít a repcevetésben. Irtására Németországban egyke-rekü kis taligát használnak. még pedig oly időben, midőn a bogár a repcén más jelentkezik, de petéit annak virágjara még le nem rakta. Ezt a taligát, melyet futó lépésben végig tolnak a repcesorok közt, mind a két sorra kihát, a mennyiben jobbra-balra fogókara van, mely a növényeket a taligán levő, és kátránygal vagy kulimássszal bekent ponyvára ráhajtja, a melyre rajta levő bogarak, a megrázkódtatás folytán, leejtik magukat. A „fogókarok” magasságát akként lehet szabályozni, hogy a taligát már a repce virágzása előtt, 36 cm.-nyi magasságnál alkalmazni lehet. A.

A ***Lycaena argiades* Pall.** hernyóját, mely egyébként csak *Lotus corniculatuson*, valamint *Medicago*- és *Trifolium*-fajtákon él, 1897-ben a *Lycaena Jolas F.* hernyójának keresére közben, a *Colutea arborescens* magtokjában találtam. A báb a rendes lepkét adta. Ugyanakkor leltem ugyanúgy a *Lycaena minima* Fsst. hernyóját is. R. L. V. 106. A. L.