

Új lepkefajváltozat Trencsén-vármegyéből.

Irta: DR. PAZSICZKY JENŐ.

1911. évi július 30-án a hegyvidékünkön is elég gyakori *Boarmia maculata* STGR. var. *Bastelbergeri* HIRSCHKE fajváltozatot gyűjtván, akadt közte egy olyan példány, mely megérdemli, hogy azt külön név alatt ismertessem. A lepke leírását a következőkben adom.

Boarmia maculata STGR. var. *Bastelbergeri* HIRSCHKE
ab. *nigromarginata* PAZSICZKY, nov. ab.

Var. *Bastelbergeri* HIRSCHKE similis, sed differt: alis latius nigromarginatis.



(PAZSICZKY SÁNDOR rajza nyomán).

A var. *Bastelbergeri*-hez közel álló, színezése azonos, rajza is nagyjában egyező, de valamivel kisebb, elülső szárnya kissé kerekített, külső szegélye jobban kidomborodó, hátsó szárnya pedig szélesebb. Az elülső szárnyon a belső harántsáv egybeolvad a középső sávval, egy felül befelé hajló Y-t alkotva; a külső szegélyen, a hullámvonal és a rojtok között egy eléggé széles és éles hullámos fekete szegélyszáv húzódik végig, melynek leghosszabb nyulványa közvetlenül a nagy fekete szemfolt mögött fekszik. Ez a szegélyszáv a hátsó szárnyon is folytatódik, itt azonban jóval szélesebb, enyhébben hullámos és az alsó oldalon is átlátszik, a középsáv elmosódott. Alul az elülső szárny jóval sötétebb mint a var. *Bastelbergeri*-nél, a külső szegély közepén világos folt nélkül, hanem helyette egy világos, kifelé álló, öblös félhold van jelen; a hátsó szárnyon egy a farzug felé keskenyedő sötét szegélyszáv húzódik végig.

Előfordul a trencsénvármegyei Drétoma községhez tartozó Zsljab-hegy erdővágásaiban.

Az új fajváltozat nevét a szárnyak sajátos szegélyszávjáról, mely a lepkének jellemző és emellett szép külsőt kölcsönöz, vettem.