

Edm. Reitter: Zwei neue Coleopteren-Varietäten.
(Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911, p. 291.)

A leírt fajváltozatok közül az egyik magyarországi és pedig a *Mycetophagus quadripustulatus* var. *Winteri*, melyet WINTER JÁNOS Nagyszeben környékén gyűjtött. Ez abban tér el a törzsfajtól, hogy egészen fekete (a fej is), csak a tapogatók, a csápok utolsó íze és a lábak vörösek, a csápok töve barnás-vörös.

CSIKI.

*

Edm. Reitter: Coleopterologische Notizen. (Wiener Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 294–295).

Ezekben a jegyzetekben szerző leírja azt a kis bogarat, melyet DIENER HUGÓ múlt évi június elején a Tátrában, Barlangliget környékén, gyűjtött gombáktól ellepett fenyőtörzsön. Szerző a bogarat az Endomychidákhoz tartozó *Agaricophilus* nembe tartozónak vélte és *A. Dieneri* néven írja le. Az egyetlen példány azonban elveszett, lepattant a ragasztócéduláról és nem volt többet megtalálható. Az *Agaricophilus*-nem eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes és így érdekes bogárföldrajzi szempontból annak hazánkban való előfordulása, ha beigazolást nyerne az a tény, hogy e faj tényleg *Agaricophilus*.

CSIKI.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomológiai Társaság“ 9. ülése januárius 20-án. —
DR. HORVÁTH GÉZA elnök üdvözlővén a nagy számban megjelent tagokat, CSIKI ERNŐ „Néhány érdekes bogárról“ című előadása kapcsán bemutatott néhány a faunánkra és a tudományra nézve új bogarat. Legérdekesebb a *Sátoristyea Meschniggi* REITT. nevű faj, melyet REITTER 1905-ben egy a baranyamegyei Sátoristye mellett gyűjtött példány alapján írt le. A M. Nemzeti Múzeumba DR. KAUFMANN ERNŐ tagtársunk révén került két Simontornyan gyűjtött példány. REITTER az állatot eleinte a testalakja alapján a Mycetophagidákhoz sorolta és csak később utalta a Byturidákhoz. Hogy a kérdéses faj tényleg Byturida, amellet szól az, hogy elülső csípőjén sarkantyút találunk, a lábfejek száma négy, ezek közül a 3. íz nagyon apró és az első két íz hosszú hártvás lebeny van, végül pedig, hogy a karmok tövén erős fog van. Előadó bemutat még négy új bogarat, melyeket LACZÓ JÓZSEF gyűjtött Trencsén vármegyében (leírásukat lásd jelen füzetben), ezek a *Bradycellus harpalinus* ab. *Csikii* LACZÓ, *Notoxus Szalavszkyi* LACZÓ, *Orsodacne cerasi* ab. *Horváthi* LACZÓ és *Crioceris asparagi* ab. *Brancsiki* LACZÓ. Bemutatott továbbá még négy külföldi új fajt, ezek az *Ophonus* (*Parophonus*) *Birói* CSIKI Kréta szigetéről és három közép-afrikai czinczér, neve-