



## Megoldásvázlatok a 2019/8. szám emelt szintű matematika gyakorló feladatsorához



### I. rész

1. a) A bal oldali ábrán egy 1 cm oldalhosszú négyzet és rajta egy 1 cm oldalhosszú szabályos háromszög látható. Mekkora annak a körnek a sugara, amely átmegy az  $A, B, E$  pontokon? (5 pont)



b) A jobb oldali ábrán egy 1 cm élhosszú kocka és rajta egy olyan 1 cm élhosszú szabályos gúla látható, amelynek minden oldalapja szabályos háromszög. Mekkora annak a gömbnek a sugara, amely átmegy az  $A, B, C, D, E$  pontokon? (7 pont)

**Megoldás.** a) Toljuk el  $DCE$  szabályos háromszögünket a  $\vec{CB}$  vektorral. A háromszög képe az eltolás után az  $ABO$  szabályos háromszög ( $A = D', B = C', O = E'$ ) lesz; emiatt  $OA = OB = 1$ . Másfelől mivel  $O = E'$  ezért  $OE = 1$ ; azaz  $O$  pont az  $A, B, E$  köréírt körének a középpontja, és a kör sugara 1 cm.



b) Voltaképpen ugyanazt csináljuk, mint két dimenzióban. Jelöljük a kocka  $C$  „fölötti” csúcsát  $F$ -fel, és toljuk el a térben a szabályos gúlánkat az  $\overrightarrow{FC}$  vektorral. Ekkor a gúla képe az eltolás után az  $ABCDO$  szabályos gúla lesz (ahol  $O = E'$  az  $E$  pont eltolt képe). Mivel  $ABCDO$  a megfelelő szabályos gúla képe, ezért  $AO = BO = CO = DO = 1$ , míg  $O = E'$  miatt  $EO = 1$ , azaz az  $O$  pont egyenlő távolságra van  $A, B, C, D, E$  pontoktól, vagyis ezen pontok köréírható gömbjének a középpontja, és a gömb sugara 1 cm.

*Megjegyzés.* A feladat megoldható számolással is, de mi nem ezt az utat követtük.

2. Egy 2019 mezőből álló játéktáblánk van a következő ábra szerint:

1	2	3	4	5	1	2	...
---	---	---	---	---	---	---	-----

(Az 1, 2, 3, 4, 5 számok vannak rajta ciklikusan, összesen 2019 hosszan.) Az 1-es mezőről indulunk, és minden mezőről annyit lépünk jobbra, amennyi az ott lévő szám.

- a) Összesen hányra lépünk rá a mezők közül? (4 pont)
- b) Mennyi azon mezők számainak összege, amire nem lépünk rá? (3 pont)
- c) A játékszabályokat a következőképpen módosítjuk: egy szabályos hatoldalú kockával dobunk, ha a dobás eredménye az 1 és 5 közötti  $d$  szám, akkor az első mező, amire rálépünk az első  $d$ ; míg ha a dobás hatos, akkor az első 1-esre lépünk, és innentől kezdve minden mezőről annyit lépünk jobbra, amennyi az ott lévő szám. Az első száz mező közül várhatóan hány mezőt látogatunk meg? (4 pont)

**Megoldás.** a) Megvizsgálva az első pár lépést azt kapjuk, hogy az első tizenegy mező közül rendre az  $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3$  (ez már a második 3-as)  $\Rightarrow 1$  (ez már a harmadik 1-es) lépünk. Mivel innen ciklikusan ismétlődnek a mezők, tíz egymás utáni mezőből pontosan 4-re lépünk rá.  $2019 = 201 \cdot 10 + 9$ , azaz lesz 201 darab teljes ciklusunk, valamint további 9 mezőnk. Az utolsó 9 mező közül 4-re lépünk rá, így összesen  $201 \cdot 4 + 4 = 808$  mezőre lépünk rá.

b) Egy teljes ciklusban a meg nem látogatott mezők összege:  $3 + 5 + 1 + 2 + 4 + 5 = 20$ , míg az utolsó 9 mező közül (hiányzik egy 5-ös a teljes ciklushoz) a meg nem látogatottak összege csak 15. Azaz azon mezők összege, amire nem lépünk rá:  $201 \cdot 20 + 15 = 4035$ .

c) A módosított szabályok szerint  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  eséllyel az első 1-es mezőről indulok, míg az első 2-es, ..., 5-ös mezőről indulás esélye  $\frac{1}{6}$ . Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es mezőről indulva rendre ugyanazt az 1, 2, 4, 3 ciklust kapjuk, csak az elején, illetve a végén különböznek. Ez alapján 1, 2, 3, 4-gyel kezdve az első 100 mező közül rendre 40, 39, 40, 38 mezőre lépünk rá; míg az első 5-ösből indulva pontosan az 5-ösöket látogatjuk meg, így összesen 20 darab mezőt. Innen a meglátogatott mezők várható száma:

$$\frac{2 \cdot 40 + 39 + 40 + 38 + 20}{6} = \frac{217}{6} \approx 36,17.$$

3. Piszkos Fred a kapitány hosszú tengeri útra indul hajójával. Egy 100 literes hordóban tiszta alkoholt vizs magával. Fred a hordóból minden éjjélkor megiszik 5 liter lötytyöt, majd felmegy a hídra és a hajó kormánykerekeit eltekeri  $30^\circ$ -kal. Ezek után visszavonul a kabinjába és a következő éjjélíg alszik. A matrózok minden nappal során feltöltik a hordót esővízzel, de a kormánykerékhez nem nyúlnak. Ha a hordó alkoholtartalma 50% alá csökken és a kapitány iszik belőle, akkor kijózanodik.

a) Az indulás után hanyadik éjjélkor józanodik ki Fred? (4 pont)

Fred fogadott egy hordó rumba Watson kapitánnyal, hogy az ő hajója gyorsabb, mint Watson fregattja. A verseny április elsején 23 óra 59-kor indult. A két hajó egyszerre indult el a nyugati irányban pontosan 10 000 kilométerre lévő közös célpont, a Rejtő-fok felé. Watson hajója állandó 8 csomó sebességgel haladt, míg Fred teknője 6 csomóval. (1 csomó sebesség megegyezik  $1,85 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ -val.) Fred amíg részeg, minden páros sorszámú nap éjjélén balra tekeri  $30^\circ$ -kal a kormánykereket, míg a páratlan sorszámú napokon jobbra; amikor viszont kijózanodik, akkor azonnal a megfelelő irányba állítja a kormánykereket (és a helyes irányt a továbbiakban tartja is). A józan Piszkos Fred továbbá minden éjjélkor képes a hajó aktuális sebességét 10%-kal növelni (és ezt az egész következő nap tartani).

b) Melyik kapitány nyeri a fogadást? (9 pont)

**Megoldás.** a) A feladat szövege alapján az indulás időpontjában  $a_0 = 1$  (azaz 100%) a hordó alkoholtartalma. Mivel minden újabb időpontban elfogy 5 liter lötyty, amit 5 liter 0%-os alkoholtartalmú vízzel pótolnak, így  $n$  nap múlva a hordó alkoholtartalma:  $a_n = 0,95^n$ . A kapitány akkor józanodik ki, ha  $a_n < 0,5$  lesz. A megfelelő egyenletet megoldva:  $0,95^n = 0,5 \Rightarrow n = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,95} \approx 13,51$ ; mivel a  $0,95^x$  függvény szigorúan monoton csökken ez azt jelenti, hogy  $a_{13} > 0,5$ , de  $a_{14} < 0,5$ , azaz Fred pontosan az indulás után két héttel józanodik ki.

b) Először számoljuk ki, hogy az egyenletes sebességgel pontosan a cél irányába mozgó Watson mennyi idő alatt éri el a Rejtő-fokot.


$$v_w = 8 \cdot 1,85 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 14,8 \frac{\text{km}}{\text{h}} \Rightarrow t_w = \frac{10\,000 \text{ km}}{14,8 \frac{\text{km}}{\text{h}}} \approx 675,68 \text{ h} \approx 28 \text{ nap és } 3,68 \text{ h}$$

alatt ér célba.

Most lássuk mit csinált eközben Fred. Fred sebessége kezdetben

$$v_F = 6 \cdot 1,85 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 11,1 \frac{\text{km}}{\text{h}} \Rightarrow s = 11,1 \cdot 24 = 266,4 \text{ km-t}$$

tesz meg 1 nap alatt Piszkos Fred. Használjuk a következő ábra jelöléseit.



Jelölje  $P_0, P_1, P_2, \dots, P_{14}$  Fred hajójának a pozícióját rendre a startnál, illetve  $1, 2, \dots$  és  $14$  nap múlva. Mivel a párosadik napokon balra, a páratlanadik napokon jobbra fordítja el a kormányt Fred, ezért minden második nap pontosan nyugat felé halad a hajó, illetve két ilyen napot „összevonva” egy olyan rombusz két szomszédos oldalán halad végig Fred teknője, amelynek oldalai  $266,4$  km hosszúak és az általuk bezárt szög  $150^\circ$ . Innen két másodsomszédos éjféle időpont pozíciója között (pl.  $P_0$  és  $P_2$ , vagy  $P_{12}$  és  $P_{14}$  között) a távolság számítható koszinusz-tétellel:

$$P_0P_2^2 = 266,4^2 + 266,4^2 - 2 \cdot 266,4 \cdot 266,4 \cdot \cos 150^\circ \approx 264\,859,8 \Rightarrow \\ \Rightarrow P_0P_2 \approx 514,645 \text{ km.}$$

Azaz két hét alatt Fred a starttól  $514,645 \cdot 7 = 3602,515$  km-re került és pontosan  $15^\circ$ -kal tért el a nyugati iránytól.

Számítsuk ki egy újabb koszinusz tétellel, mennyi út van még hátra (a pontos irányt hagyjuk meg a Kapitánynak). A hátralévő útra:

$$s_F^2 = 10\,000^2 + 3602,515^2 - 2 \cdot 10\,000 \cdot 3602,515 \cdot \cos 15^\circ \approx 43\,382\,869 \Rightarrow \\ \Rightarrow s_F \approx 6586,567 \text{ km}$$

út van még hátra két hét után.

Lássuk, mennyi idő alatt teszi meg a józan Fred ezt az utat. Jelöljük  $b_n$ -nel a két hét utáni  $n$ -edik napon Fred hajója által megtett utat (kilométerben). Ekkor  $b_n = 266,4 \cdot 1,1^{n-1}$ . Az első  $n$  nap során ekkor

$$s_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = 266,4 \cdot \frac{1,1^n - 1}{1,1 - 1} = 2664(1,1^n - 1) = 2664 \cdot 1,1^n - 2664 \text{ km-t}$$


tesz meg. Azt keressük, hogy mikor lesz  $s_n = 6586,567$ .

$$s_n = 2664 \cdot 1,1^n - 2664 = 6586,567 \Rightarrow 2664 \cdot 1,1^n = 9250,567 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1,1^n = \frac{9250,567}{2664} \Rightarrow n = \frac{\ln\left(\frac{9250,567}{2664}\right)}{\ln 1,1} \approx 13,061.$$

Mivel az  $1,1^x$  függvény szigorúan monoton növekvő, ezért ez azt jelenti, hogy (kijózanodása után)  $13$  nap alatt még nem ér célba Fred, de a  $14$ -dik, vagyis összességében a  $28$ -dik napon már eléri a Rejtő-fokot.

Azaz Piszkos Fred nyeri a fogadást (és így a hordó rumot), hiszen körülbelül egy nappal korábban ér a célba, mint Watson.



4. Az ábra egy park térképét ábrázolja. A parkot három körvonal határolja; a körök rendre az  $A_1(-2; 3)$ ,  $A_2(-7; -2)$ ,  $A_3(-2; -7)$ , illetve a  $B_1(1; -6)$ ,  $B_2(10; -3)$ ,  $B_3(9; 0)$ , valamint a  $C_1(5; 4)$ ,  $C_2(2; 7)$ ,  $C_3(-1; 4)$  pontok által meghatározott körök köréírt körei.

a) Igazoljuk, hogy az  $A_1A_2A_3$ , a  $B_1B_2B_3$ , valamint a  $C_1C_2C_3$  háromszögek mind derékszögű háromszögek.

(4 pont)

b) Igazoljuk, hogy az  $A_3, B_1, B_2$ , valamint a  $B_3, C_1, C_2$ , illetve a  $C_3, A_1, A_2$  ponthármások rendre egy-egy egyenesre esnek.

(3 pont)

c) A park építésze egy „különleges” helyre kutat szeretne fúrtni. Úgy tűnik neki, hogy a parkot alkotó három kör egy közös pontban metszi egymást (ami eléggé különleges lenne). Igaza van-e az építésznek? Ha igen, pontosan hol van ez a pont?

(8 pont)

**Megoldás.** a) Az ábra alapján úgy tűnik, hogy a háromszögek olyan háromszögek, ahol a 2-es indexű csúcs szöge derékszög, míg a másik két csúcsot összekötő átfogó egyben a kör átmérője is. Ezt fogjuk igazolni.

Az  $A_1, A_3$  pontok távolsága 10, az  $O_A$  felezőpontjuk koordinátái:  $O_A(-2; -2)$ . Ez a felezőpont pedig pontosan 5 távolságra van  $A_2$ -től, azaz ez a háromszög egyenlőszárú és derékszögű háromszög, és a köréírt kör sugara 5.

Hasonlóan a  $C_1, C_3$  pontok távolsága 6, az  $O_C$  felezőpontjuk koordinátái:  $O_C(2; 4)$ . Ez a felezőpont pedig pontosan 3 távolságra van  $C_2$ -től, azaz ez a háromszög is egyenlőszárú és derékszögű háromszög, és a köréírt kör sugara 3.

Míg a  $B_1, B_3$  pontok távolsága Pitagorasz tételével:  $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ , az  $O_B$  felezőpontjuk koordinátái:  $O_B(5; -3)$ . Ez a felezőpont pedig pontosan 5 távolságra van  $B_2$ -től, azaz ez a háromszög is derékszögű háromszög (de nem egyenlőszárú), és a köréírt kör sugara 5.

b) Azt fogjuk használni, hogy ha a  $P, Q, R$  pontokra igaz az, hogy  $\overrightarrow{PQ} = c \cdot \overrightarrow{PR}$  valamely  $c$  valós számra, akkor a három pont egy egyenesre esik.

Az  $A_3, B_1, B_2$  pontokra:  $\overrightarrow{A_3B_1} = (3; 1)$ , míg  $\overrightarrow{A_3B_2} = (12; 4) = 4 \cdot \overrightarrow{A_3B_1}$ , azaz  $A_3, B_1, B_2$  valóban egy egyenesre esnek.

A  $B_3, C_1, C_2$  pontokra:  $\overrightarrow{B_3C_1} = (-4; 4)$ , míg  $\overrightarrow{B_3C_2} = (-7; 7) = \frac{7}{4} \cdot \overrightarrow{B_3C_1}$ , azaz a  $B_3, C_1, C_2$  pontok is egy egyenesre esnek.

A  $C_3, A_1, A_2$  pontokra:  $\overrightarrow{C_3A_1} = (-1; -1)$ , míg  $\overrightarrow{C_3A_2} = (-6; -6) = 6 \cdot \overrightarrow{C_3A_1}$ , azaz a  $C_3, A_1, A_2$  pontok is egy egyenesre esnek.

c) Az a) pont alapján a körök egyenletei rendre:  $k_A : (x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 25$ ;  $k_B : (x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 25$ ;  $k_C : (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 9$ .

Számítsuk ki  $k_A$  és  $k_B$  metszéspontjait. Ezekre a metszéspontokra igaz:

$$\begin{aligned}(x+2)^2 + (y+2)^2 &= (x-5)^2 + (y+3)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 4 + y^2 + 4y + 4 &= x^2 - 10x + 25 + y^2 + 6y + 9 \Rightarrow \\ \Rightarrow 14x - 26 = 2y &\Rightarrow y = 7x - 13.\end{aligned}$$

Ezt a (hatványvonal) egyenletet visszahelyettesítve mondjuk  $k_A$  egyenletébe kapjuk:

$$\begin{aligned}(x+2)^2 + (7x-11)^2 &= 25 \Rightarrow x^2 + 4x + 4 + 49x^2 - 154x + 121 - 25 = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 50x^2 - 150x + 100 &= 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0.\end{aligned}$$

Innen a  $k_A$  és  $k_B$  körök metszéspontjai:  $(1; -6)$  és  $(2; 1)$ .

Ha ezek közül bármelyik rajta van a harmadik körön, akkor készen vagyunk. Vizsgáljuk meg, hogy a  $(2; 1)$  pont koordinátái teljesítik-e a harmadik köregyenletet.  $(2-2)^2 + (1-4)^2 = 0^2 + (-3)^2 = 9$ , azaz ez a metszéspont rajta van a  $k_C$  körön is (a másik metszéspont nincs rajta).

Ezzel megvagyunk, a három kör valóban egy közös pontban, a  $(2; 1)$  pontban metszi egymást.

## II. rész

5. a) Adjuk meg a  $h(x) = \cos 2x - \sin 2x + 2 \sin^2 x + 1$  függvény szélsőértékeit. Hol veszi fel a szélsőértékeit a függvény? (6 pont)

b) Legyen  $f(x) = x^2 - 2x + 2$ , míg a  $g_n(x)$  a következőképpen definiált függvény-sorozat:

$$g_1(x) = f(x); \quad g_n(x) = f(g_{n-1}(x)) \quad (\text{ha } n \geq 2).$$

Adjuk meg  $g_{2019}\left(\frac{3}{2}\right)$  tizedesvessző utáni első 100 számjegyét. (10 pont)

**Megoldás.** a) A duplaszögek addíciós képleteivel:

$$\begin{aligned}h(x) &= \cos 2x - \sin 2x + 2 \sin^2 x + 1 = \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + 2 \sin^2 x + 1 = \\ &= \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x + 1 = (\cos x - \sin x)^2 + 1.\end{aligned}$$

Mivel  $(\cos x - \sin x)^2 \geq 0$ , ezért  $h(x) \geq 1$  és ezt az 1 minimumértéket  $h(x)$  fel is veszi mindenütt, ahol  $\cos x = \sin x \Rightarrow \operatorname{tg} x = 1$ , azaz a minimum helyei:  $x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

Maximum ott lehet, ahol a  $j(x) = \cos x - \sin x$  különbségnek pozitív maximuma, vagy negatív minimuma van. Deriváljuk a  $j(x)$  függvényt:

$$j'(x) = -\sin x - \cos x,$$

$$j'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\cos x \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k \cdot \pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

„Minden” esetben  $j''(x) = -\cos x + \sin x \neq 0$ , azaz ezek valódi szélsőértékei  $j(x)$ -nek, és mivel ezeken a helyeken  $|j'(x)| = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ , ezért minden ilyen helyre  $(\cos x - \sin x)^2 + 1 = j^2(x) + 1 = (\sqrt{2})^2 + 1 = 3$ .

Azaz  $h(x)$  maximuma 3 és a maximumának helyei:  $x = \frac{3\pi}{4} + k \cdot \pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

b) Írjuk fel  $f(x)$ -t  $f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$  alakban, és vizsgáljuk meg a  $g_1(x), g_2(x), g_3(x), \dots$  függvények értékeit  $x = \frac{3}{2}$ -nél.

$$g_1\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2} - 1\right)^2 + 1 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{2^2} + 1$$

(ezt ne is alakítsuk tovább);

$$g_2\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(g_1\left(\frac{3}{2}\right)\right) = \left(\frac{1}{4} + 1 - 1\right)^2 + 1 = \frac{1}{16} + 1 = \frac{1}{2^{2^2}} + 1;$$

$$g_3\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(g_2\left(\frac{3}{2}\right)\right) = \left(\frac{1}{16} + 1 - 1\right)^2 + 1 = \frac{1}{256} + 1 = \frac{1}{2^{2^3}} + 1.$$

Mivel

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2^{2^n}} + 1\right) &= \left(\frac{1}{2^{2^n}} + 1 - 1\right)^2 + 1 = \left(\frac{1}{2^{2^n}}\right)^2 + 1 = \frac{1}{(2^{2^n})^2} + 1 = \\ &= \frac{1}{2^{2^n \cdot 2}} + 1 = \frac{1}{2^{2^{n+1}}} + 1, \end{aligned}$$

ezért adódik, hogy  $g_n\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2^{2^n}} + 1$ , azaz  $g_{2019}\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2^{2^{2019}}} + 1$ .

Vizsgáljuk csak  $\frac{1}{2^{2^{2019}}}$ -t.

$$0 < \frac{1}{2^{2^{2019}}} < \frac{1}{2^{2019}} < \frac{1}{2^{334}} < \frac{1}{10^{100}}$$

(ez utóbbi  $1024 = 2^{10} > 10^3 = 1000$  miatt igaz); azaz  $\frac{1}{2^{2^{2019}}}$ , és így  $\frac{1}{2^{2^{2019}}} + 1 = g_{2019}\left(\frac{3}{2}\right)$  tizedesvessző utáni első száz jegye mind 0.

**6.** *Néhány vegyi anyag-szállító kamionban különféle kóddal (A, B, C, D, E, F, G, H) ellátott palackokat szállítanak. A robbanásveszély miatt bizonyos palackokat nem szabad együtt szállítani. Ezeket a „tiltásokat” a következő táblázat tartalmazza:*

<i>Vegyi anyag címkéje:</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>Ezzel nem szállítható:</i>	<i>B, E, F</i>	<i>A, C, G</i>	<i>B, E, H</i>	<i>F, G</i>
<i>Vegyi anyag címkéje:</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>Ezzel nem szállítható:</i>	<i>A, C, F, H</i>	<i>A, D, E, G, H</i>	<i>B, D, F, H</i>	<i>C, E, F, G</i>

- a) Legalább hány kamion kell, ha minden anyagból pontosan egy-egy palackot kell elszállítanunk? (Minden kamionba legfeljebb négy palack fér el.) (6 pont)
- b) Hány kamion kell, ha minden anyagból pontosan 5-5 palackot kell elszállítani? (Most is minden kamionba legfeljebb négy palack fér el.) (6 pont)
- c) Véletlenszerűen kiválasztva két különböző palackot mennyi az esélye annak, hogy azokat nem tehetjük egy kamionra? (4 pont)

**Megoldás.** a) Rajzoljuk meg a feladat gráfját (két vegyianyag-kódot akkor kötünk össze, ha a két palack nem szállítható együtt).

Színezzük ki a gráf csúcsait úgy, hogy bármely két olyan csúcs, amit él köt össze, különböző szint kapjon. Megmutatjuk, hogy bármely ilyen színezéshez legalább négy szín kell (azaz a gráf csúcskromatikus száma 4), ami azt jelenti, hogy legalább négy kamion kell a palackok szállításához.

Indirekt tegyük fel, hogy a gráf csúcsai 3 színnel jól színezhetőek. Ekkor a teljes 3-klikket alkotó  $F, G, H$  csúcsoknál ezt a három szintet fel is kell használnunk. Legyen  $F, G, H$  színe rendre zöld, piros és kék; (innen fonalasan)  $\Rightarrow E$  színe csak piros,  $D$  színe csak kék,  $C$  színe csak zöld,  $B$  színe csak kék lehet (mert mindegyiknek van másik két színű szomszédja). Ekkor viszont  $A$  csúcsnak lesz piros ( $E$ ), kék ( $B$ ) és zöld ( $F$ ) színű szomszédja is, vagyis  $A$  megszínezéséhez szükséges egy negyedik szín is. Ezzel igazoltuk, hogy a gráf csúcskromatikus száma legalább 4; 4 színnel pedig (mondjuk  $A$ -t sárgának választva) a csúcsok jól színezhetőek.

Az eddigiek alapján a szállításhoz legalább 4 kamion kell (az azonos színekkel jelölt palackok kerülnek egy kamionba). Egy lehetséges szétosztás:

1. kamion	2. kamion	3. kamion	4. kamion
$A$	$B, H, D$	$C, F$	$E, G$

b) Mivel 40 palack van, ezért minimum 10 kamion kell. Ez viszont elég is, ahogyan a következő táblázat mutatja (nagyon sok különböző megoldás lehet).


1. kamion	2. kamion	3. kamion	4. kamion	5. kamion
$AAAH$	$BBBB$	$CCCC$	$AACD$	$DDDD$
6. kamion	7. kamion	8. kamion	9. kamion	10. kamion
$BEEF$	$EEEG$	$FFFF$	$GGGG$	$HHHH$

c) A feladat gráfjában 14 él van (a táblázatbeli bejegyzések száma 28, de a szimmetria miatt ez 14 párt jelent); azaz pontosan 14 pár olyan palack van, amik nem kerülhetnek össze. Innen a kérdéses valószínűség:

$$P = \frac{\text{„kedvező” párok száma}}{\text{összes párok száma}} = \frac{14}{\binom{8}{2}} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}.$$



7. Egy cég gyémánt alakú emblémája olyan ötszög, melynek csúcsai egy szabályos hétszög megfelelő  $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_6)$  csúcsai (lásd jobb oldali ábra).



A cég 10 000 darab az emblémával ellátott kitűzőt rendelt. A nyomdai költségekben két tétellel kell kalkulálni: 10 000 centiméternyi vonal megrajzolása 50 euróba kerül, míg 10 000 cm<sup>2</sup>-nyi terület besatírozása 200 euróba.

a) Mennyi lesz a 10 000 kitűző nyomdai költsége, ha a szabályos hétszög egy-egy oldala 2 cm hosszú? (10 pont)

b) A cég pirosra úgy találta, hogy az embléma nem elég színes. Szeretné a gyémánt 5 összefüggő részében megjeleníteni a piros, a fehér és a zöld színeket. Hányféle különböző ilyen három színű emblémát kaphatunk, ha azt szeretnénk, hogy az élben szomszédos részek színe különböző legyen, valamint mind a három szín meg is jelenjen az emblémában? (6 pont)

**Megoldás.** a) Számítsuk ki a szabályos hétszög kétféle átlójának a hosszát. Koszinusztétellel:

$$P_1P_3^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos \frac{900^\circ}{7} \approx 12,988 \Rightarrow P_1P_3 \approx 3,604,$$

míg

$$P_1P_4^2 = 2^2 + P_1P_3^2 - 2 \cdot 2 \cdot P_1P_3 \cdot \cos \left( \frac{900^\circ}{7} \cdot \frac{4}{5} \right) \approx 20,196 \Rightarrow P_1P_4 \approx 4,494.$$

Innen a vonalak megrajzolásának költsége:

$$\approx (3 \cdot 2 + 4 \cdot 3,604 + 4,494) \cdot 50 = 24,91 \cdot 50 = 1245,5 \text{ euró.}$$

Kiszámoljuk a satírozott részek területeit is. A  $P_1P_3$  és  $P_2P_4$  metszéspontját jelöljük  $O$ -val.  $P_2P_3O$  olyan egyenlőszárú háromszög, melynek  $P_2P_3$  alapja 2 cm hosszú, míg alapján fekvő szögei nagysága:  $\frac{180^\circ}{7}$ , innen az alaphoz tartozó  $m$  magasságra:  $\text{tg} \left( \frac{180^\circ}{7} \right) = m \approx 0,4816$  és így

$$T_{P_2P_3O} \approx \frac{2 \cdot 0,4816}{2} = 0,4816.$$

A  $P_1P_4O$  háromszög pedig hasonló  $P_2P_3O$ -hoz, és a hasonlóság aránya éppen  $\lambda = \frac{P_1P_4}{P_2P_3} \approx \frac{4,494}{2} = 2,247$ , innen  $T_{P_1P_4O} \approx 2,247^2 \cdot 0,4816 \approx 2,4314$ . Innen a satírozás költsége:  $\approx (0,4816 + 2,4314) \cdot 200 = 582,6$  euró.

- Azaz a nyomdai összköltség hozzávetőlegesen:  $1245,5 + 582,6 = 1828,1$  euró.
- b) Jelöljük letről felfele a részeket  $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5$ -tel ( $R_2$  az az egyetlen rész, amelynek 3 szomszédja van, az  $R_3, R_4$  részek az egybevágó kisebb háromszögek.)
- $R_2$  kitöltésére 3 lehetőségünk van.
  - Ha ekkor  $R_3$  és  $R_4$  színe különböző (ez kétféleképpen lehetséges), akkor  $R_5$  színénél nincs választási lehetőségünk, ugyanazt a színt kapja  $R_5$ , mint  $R_2$ ; viszont  $R_1$ -re két különböző színt is választhatunk. Az esetek száma itt  $3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 12$ .
  - Ha azonban  $R_3$  és  $R_4$  színe azonos (ez is kétféleképpen lehetséges), akkor eddig csak két színt használtunk fel, azaz vagy  $R_1$ , vagy  $R_5$  (vagy mindkettő) színe a harmadik szín kell, hogy legyen. Ha csak  $R_1$  kapja a harmadik színt, akkor  $R_5$  színe egyértelmű, hasonlóan ha csak  $R_5$  kapja a harmadik színt, akkor  $R_1$  színe egyértelmű, és az is egyértelmű eset, ha mindkét területet a harmadik színnel színezem (ez így összesen háromféle lehetséges színezés); azaz ezen az ágon  $3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$  lehetséges eset van.

Összesen tehát  $12 + 18 = 30$ -féleképp lehet kiszínezni az emblémát.

**8.** Egy speciális trópusi halaknak való felül nyitott, alul és oldalt üveg akváriumot építünk. Az akvárium paramétereire EU-előírások alapján a következőknek kell teljesülnie:

- Az akvárium térfogata  $1 \text{ m}^3$  kell, hogy legyen;
- az akvárium alapja olyan téglalap, melynél az oldalak aránya  $1 : 2$ ;
- a négy oldalfal olyan üvegből készül, melynek ára  $90$  euró négyzetméterenként;
- az akvárium alsó lapja pedig olyan üvegből készül, melynek négyzetmétere  $120$  euróba kerül.

Milyenek válasszuk az akvárium éleit, hogy a lehető legkevesebb legyen az anyagköltség, és az hány euró lesz? (16 pont)

**Megoldás.** Jelöljük az akvárium alaplapjának oldalait  $x, 2x$ -szel (a 2. feltétel alapján), míg a magasságát  $y$ -nal. Ekkor a feltételek alapján  $V = 2x^2y = 1 \Rightarrow \Rightarrow y = \frac{1}{2x^2}$ . Az anyagköltségfüggvényt  $f(x, y)$ -nak nevezve pedig teljesül:

$$f(x, y) = 2x^2 \cdot 120 + 2(2xy) \cdot 90 + 2(xy) \cdot 90 = 240x^2 + 540xy.$$

Ennek a költségfüggvénynek szeretnénk a (lokális) szélsőértékeit megtalálni.

$f(x, y)$ -ba behelyettesítve  $y = \frac{1}{2x^2}$ -t a költségfüggvény már csak  $x$ -től függ:  
 $f(x) = 240x^2 + \frac{270}{x}$ .

$$f'(x) = 480x - \frac{270}{x^2},$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 480x = \frac{270}{x^2} \Rightarrow x^3 = \frac{270}{480} \Rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{27}{48}} = \frac{3}{2\sqrt[3]{6}} \approx 0,8255.$$

Vizsgáljuk meg  $f(x)$  második deriváltját is:  $f''(x) = 480 + \frac{540}{x^2} > 0$ , azaz a függvénynek a kapott helyen valóban lokális minimuma van. Számoljuk ki  $y$ -t:

$$y = \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2 \cdot \frac{9}{4\sqrt[3]{36}}} = \frac{2\sqrt[3]{36}}{9} \approx 0,7338.$$

Azt kaptuk, hogy az optimális akvárium alapélei, illetve magassága (méterben):  $x \approx 0,8255$ ;  $2x \approx 1,651$ ;  $y \approx 0,7338$  és ekkor a (minimális) anyagköltség:  $f(x, y) \approx 490,6$  euró.

9. *Hány olyan  $0 < \frac{a}{b} < 1$  és  $0 < \frac{c}{d} < 1$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{N}^+$ ) nem egyszerűsíthető közösleges tört van, hogy az*

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{c}{d}\right)$$

szorzat egész, valamint  $a + b + c + d = 100$ ?

(16 pont)

**Megoldás.** Mivel  $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in (0, 1)$  és 1 közé esik, azért  $1 < \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{c}{d}\right) < 4$ , azaz a szorzat csak 2, vagy 3 lehet. A két esetet külön vizsgáljuk.

Ha

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{c}{d}\right) = 2 \Rightarrow 1 + \frac{c}{d} = \frac{2b}{a+b} \Rightarrow \frac{c}{d} = \frac{2b}{a+b} - 1 = \frac{b-a}{a+b}.$$

Ha a törtek nem egyszerűsíthetők, akkor  $c = b - a$ , és  $d = a + b$  kell, hogy teljesüljön, ráadásul  $a$ -nak és  $b$ -nek különböző paritásúnak kell lennie (mert különben  $c$  és  $d$  is páros, és így  $\frac{c}{d}$  egyszerűsíthető lenne).

Mivel  $a + b + c + d = 100 \Rightarrow a + b + b - a + a + b = a + 3b = 100 \Rightarrow a = 100 - 3b$ . Innen ha  $b$  páratlan, akkor  $a = 100 - 3b$  is páratlan; míg ha  $b$  páros, akkor  $a$  is páros. Ekkor viszont (bármelyik esetben)  $c = b - a$  és  $d = b + a$  is páros ellentmondásban azzal, hogy a  $\frac{c}{d}$  tört nem egyszerűsíthető. Azaz ezen az ágon nem kapunk megoldást.

Ha

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{c}{d}\right) = 3 \Rightarrow 1 + \frac{c}{d} = \frac{3b}{a+b} \Rightarrow \frac{c}{d} = \frac{3b}{a+b} - 1 = \frac{2b-a}{a+b}.$$

Ha a törtek nem egyszerűsíthetők, akkor  $c = 2b - a$ , és  $d = a + b$  kell, hogy teljesüljön.

Mivel  $a + b + c + d = 100 \Rightarrow a + b + 2b - a + a + b = a + 4b = 100 \Rightarrow b = 25 - \frac{a}{4}$ . Innen  $a$  4-gyel osztható szám, míg  $b$  nagyobb, de legfeljebb kétszer akkora (az eddigiek alapján). A lehetőségeket  $a, b$ -re (és a számolt  $c, d$ -re) soroljuk fel egy táblázatban.

$a$	$b$	$c = 2b - a$	$d = b + a$	
4	24	44	28	a törtek egyszerűsíthetők
8	23	38	31	$c > d$ így $c/d > 1$
12	22	32	34	a törtek egyszerűsíthetők
16	21	26	37	ez megoldás
20	20	20	40	a törtek egyszerűsíthetők, illetve $a \not< b$