



## Bizonyítsunk sokféleképpen – egy érettségi feladat továbbgondolása



### 1. Előzmények

A 2020. októberi matematika érettségi emelt szintű írásbeli vizsga 9.b) feladata a következő volt<sup>1</sup>:

9.b) Jelölje a 4 egység oldalú  $ABC$  szabályos háromszög  $BC$  oldalának  $B$ -hez közelebbi negyedelőpontját  $P$ , a  $CA$  oldal  $C$ -hez közelebbi negyedelőpontját  $Q$ , az  $AB$  oldal  $A$ -hoz közelebbi negyedelőpontját pedig  $R$ . Jelölje továbbá  $AP$  és  $BQ$  szakaszok metszéspontját  $X$ ,  $BQ$  és  $CR$  szakaszok metszéspontját  $Y$ , végül  $CR$  és  $AP$  szakaszok metszéspontját  $Z$  (1. ábra).



1. ábra

Határozza meg az  $XYZ$  háromszög területét!

A hivatalos javítási útmutatóban a feladatra négy megoldás található. Ebben a cikkben néhány észrevétel mellett további megoldási és általánosítási lehetőségeket sorolunk fel.

### 2. A hivatalos megoldások

Röviden áttekintjük a javítási útmutatóban szereplő megoldásokat.<sup>2</sup>

Előzetesen megállapíthatjuk, hogy a harmadrendű forgásszimmetria miatt:

- az  $ABP$ ,  $BCQ$ ,  $CAR$  háromszögek egybevágók;
- az  $ABX$ ,  $BCY$ ,  $CAZ$  háromszögek egybevágók;
- az  $ARZ$ ,  $BPX$  és  $CQY$  háromszögek egybevágók;
- az  $XYZ$  háromszög szabályos.

**I. megoldás.** A  $ZX$  szakasz hosszát számítjuk ki, ebből az  $XYZ$  háromszög területe már számolható.


Az  $ABP$  háromszögben ismert három adat, így meghatározhatjuk pl. a koszinusztétellel az  $AP$  szakasz hosszát és a  $BAP\angle = \alpha$  szöveget. Ekkor az  $AZR$  háromszögben ismerünk három adatot ( $ARZ\angle = APB\angle = 120^\circ - \alpha$ ), így pl. a szinusz-

<sup>1</sup>[https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok\\_2020osz\\_emelt/e\\_mat\\_20okt\\_fl.pdf](https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2020osz_emelt/e_mat_20okt_fl.pdf)


<sup>2</sup>[https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok\\_2020osz\\_emelt/e\\_mat\\_20okt\\_ut.pdf](https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2020osz_emelt/e_mat_20okt_ut.pdf)

tétellel  $AZ$  és  $ZR$  kiszámolható. És mivel  $XP = ZR$ , így  $ZX = AP - AZ - ZR$  (2. ábra).

Az  $XYZ$  szabályos háromszög területe pedig  $t = \frac{\sqrt{3}}{4} ZX^2$ . (A számadatokkal  $t \approx 2,13$ .)



2. ábra




3. ábra

**II. megoldás.** Kiszámítjuk az  $ABX$  háromszög területét, majd az  $ABC$  háromszög területéből kivonjuk ennek a 3-szorosát.

Mint az I. megoldásban, kiszámítjuk  $AP$ -t és az  $\alpha$  szöveget. Ekkor az  $ABX$  háromszögben is három adat ismert ( $\angle ABX = 60^\circ - \alpha$ ), így meghatározható az  $AX$  oldal, és az  $ABX$  háromszög területét megkapjuk a trigonometrikus területképlet alkalmazásával (3. ábra).

**III. megoldás.** A  $ZX$  szakasz hosszát számítjuk ki, mint az I. megoldásban, de most trigonometria alkalmazása nélkül.



4. ábra

A  $P$  pont  $AB$ -re eső merőleges vetületét jelöljük  $V$ -vel (4. ábra). Rendre meghatározhatjuk  $PV$  és  $VB$  hosszát (a  $PVB$  „félszabályos” háromszög befogói), majd  $AV$ -t ( $AV = AB - VB$ ), végül  $AP$ -t (az  $AVP$  derékszögű háromszögből Pitagorasz tételével).

Az  $ABP$  és a  $BXP$  háromszögek hasonlók, mert két szögük egyenlő ( $\angle PBX = \angle PAB = \alpha$ , lásd a 2. ábrát). A megfelelő oldalak arányából egyrészt  $\frac{XP}{PB} = \frac{PB}{PA}$ , innen  $XP$  számolható; másrészt  $XB = 4XP (= AZ)$ .

$ZX = AP - XB - XP$ , vagyis megkaptuk a szabályos háromszög egy oldalát.

**IV. megoldás.** A  $ZX$  szakasz hosszát számítjuk ki, erősebb trigonometriai eszközök segítségével.

Az  $ABP$  háromszögben szinusztétellel  $\frac{\sin \alpha}{\sin(120^\circ - \alpha)} = \frac{1}{4}$ , innen az addíciós tételek segítségével kiszámítjuk  $\alpha$ -t. Az  $ABX$  háromszögben ismert három adat, így az oldalakat meghatározhatjuk a szinusztétellel, például

$$\frac{\sin \alpha}{\sin 120^\circ} = \frac{BX}{4} \quad \text{és} \quad \frac{\sin(60^\circ - \alpha)}{\sin 120^\circ} = \frac{AX}{4}$$

alapján. Ezután az  $XYZ$  háromszög oldala már adódik:


$$ZX = AX - AZ = AX - BX.$$

### 3. Egy további megoldás

Ez a megoldás a fejlesztés során sokáig szerepelt az útmutatóban, de végül nem került be.

**V. megoldás.** A III. megoldás módosításával a keresett területet „kiszítáljuk”.

Az  $XYZ$  háromszög területét megkaphatjuk úgy is, hogy az  $ABC$  háromszög területéből levonjuk az  $ABP$  háromszög területének 3-szorosát, majd hozzáadjuk az  $ARZ$  háromszög területének 3-szorosát (ugyanis az előző levonásnál az  $ARZ$  háromszög területét 6-szor vontuk le, holott csak 3-szor kellett volna, 5. ábra).



5. ábra

A szokásos módon járunk el: az  $ABP$  háromszögben a területet kiszámíthatjuk a trigonometrikus területképlettel, majd meghatározhatjuk  $AP$  és  $\alpha$  értékét. Az  $ARZ$  háromszögben pedig ismerjük a szögeket és az  $AR$  oldalt, így a területe már számolható.

### 4. Általánosítás

Az egyik általánosítási lehetőség, ha tetszőleges,  $\frac{1}{2}$ -nél kisebb  $r = AR : AB$  aránnyal dolgozunk. (A kitűzött feladatban  $r = \frac{1}{4}$  volt.)

Jelölje az  $ABC$  háromszög oldalainak hosszát  $a$ , ekkor tehát  $AR = BP = CQ = ar$ .

Az  $ABP$  háromszögben a koszinusztételből  $AP = a\sqrt{1-r+r^2}$ .

Az  $ABP$  és a  $BXP$  háromszögek hasonlóságából (III. megoldás)  $\frac{XP}{PB} = \frac{PB}{PA}$ , innen

$$XP = \frac{a^2 r^2}{a\sqrt{1-r+r^2}} = a \cdot \frac{r^2}{\sqrt{1-r+r^2}};$$

valamint

$$BX = AZ = \frac{XP}{r} = a \cdot \frac{r}{\sqrt{1-r+r^2}}.$$

$$ZX = AP - AZ - XP = a\sqrt{1-r+r^2} - \frac{ar}{\sqrt{1-r+r^2}} - \frac{ar^2}{\sqrt{1-r+r^2}},$$

átalakítások után  $ZX = a \cdot \frac{1-2r}{\sqrt{1-r+r^2}}$  adódik.

Az  $XYZ$  háromszög területe:

$$T_{XYZ} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot \frac{(1-2r)^2}{1-r+r^2}.$$


*Megjegyzések:*

- Megkaptuk az egyes szakaszok hosszának arányát:  $AZ : ZX : XP = r : (1 - 2r) : r^2$ ;
- s megkaptuk az  $XYZ$  és  $ABC$  háromszögek területének arányát is:

$$\frac{T_{XYZ}}{T_{ABC}} = \frac{(1-2r)^2}{1-r+r^2}.$$

– Az  $a = 4$  és  $r = \frac{1}{4}$  helyettesítésekkel megkapjuk a III. megoldásban szereplő pontos értékeket:<sup>3</sup>

$$T_{XYZ} = \frac{16\sqrt{3}}{13}, \quad AZ : ZX : XP = 4 : 8 : 1, \quad \frac{T_{XYZ}}{T_{ABC}} = \frac{4}{13}.$$



6. ábra

– Érdekeséggéppén ábrázolhatjuk a  $k : ]0; 0,5[ \rightarrow \mathbb{R}$ ;  
 $k(r) = \frac{T_{XYZ}}{T_{ABC}} = \frac{(1-2r)^2}{1-r+r^2}$  függvényt (6. ábra).

Néhány érdekes függvényérték:

$$k\left(\frac{1}{20}\right) = \frac{108}{127}; \quad k\left(\frac{1}{12}\right) = \frac{100}{133};$$

$$k\left(\frac{1}{10}\right) = \frac{64}{91}; \quad k\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{9}{21}; \quad k\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{7};$$

$$k\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{19}; \quad k\left(\frac{3}{7}\right) = \frac{1}{37}; \quad k\left(\frac{4}{9}\right) = \frac{1}{61};$$

$$k\left(\frac{n}{2n+1}\right) = \frac{1}{3n^2+3n+1}.$$

### 5. További megoldások területarányok segítségével

Ezekben a megoldásokban azt használjuk fel, hogy az azonos magasságú háromszögek területe arányos az alapjukkal.

**VI. megoldás** ( $r = \frac{1}{4}$ ). Mivel  $\frac{BP}{PC} = \frac{AR}{RB} = \frac{1}{3}$ , így

$$\frac{T_{BPZ}}{T_{CPZ}} = \frac{1}{3}, \quad \text{illetve} \quad \frac{T_{ARC}}{T_{BRC}} = \frac{1}{3} \quad \text{és} \quad \frac{T_{ARZ}}{T_{BRZ}} = \frac{1}{3}.$$

Ez az arány a területek különbségére is megmarad, így

$$\frac{T_{ARC} - T_{ARZ}}{T_{BRC} - T_{BRZ}} = \frac{T_{AZC}}{T_{BZC}} = \frac{1}{3}$$


is teljesül.

<sup>3</sup>Minden megoldás részletes kidolgozása olvasható honlapunkon a teljes cikkben (az ábrák számozása a teljes cikket követi). Megpróbálhatjuk az önálló kidolgozásukat. <https://www.komal.hu/cikkek/cikklista.h.shtml>

Húzzuk be a  $BZ$  szakaszt, és jelölje a 7. ábra szerinti részháromszögek területét  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , az  $ABC$  háromszög területét  $T$ . Ekkor az ábrán szereplő másik két háromszög területe  $3y$  és  $3z$ . A fenti összefüggések alapján felírható az alábbi egyenletrendszer:

$$(1) \quad \frac{x}{4y} = \frac{1}{3},$$

$$(2) \quad x + 3y = \frac{3}{4}T.$$



7. ábra

(1)-ből  $y = \frac{3x}{4}$ , ezt (2)-be írva  $x = \frac{3}{13}T$ .

A forgásszimmetria miatt kapjuk (II. megoldás), hogy

$$T_{XYZ} = T - 3x = \frac{4}{13}T.$$

*Megjegyzések:*

- Nem kellett kiszámolnunk  $z$  értékét, de  $T_{ARC} = z + x = \frac{T}{4}$ -ből  $z = \frac{T}{52} = \frac{1}{12}x$ .
- A kapott eredmény természetesen összhangban van az általánosítás

$$T_{XYZ} = \frac{(1-2r)^2}{1-r+r^2}T$$

formulájával,  $r = \frac{1}{4}$  esetén.

– Észrevehetjük, hogy nem használtuk fel, hogy az  $ABC$  háromszög oldalai egyenlők, vagyis eredményünk tetszőleges háromszögre igaz.

**Második általánosítás.** Ha tetszőleges  $T$  területű háromszögben behúzzuk az oldalakat megfelelő módon negyedelő szakaszokat (továbbiakban: osztószakaszok), akkor a keletkezett  $XYZ$  háromszög területére

$$T_{XYZ} = \frac{4}{13}T.$$

A további megoldások az általános  $ABC$  háromszögre vonatkoznak.

**VII. megoldás** (harmadik általánosítás). A hagyományos módon legyen az  $ABC$  háromszög oldalainak hossza rendre  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , ekkor  $AR = rc$  és  $BP = ra$ .

Próbáljuk meg a VI. megoldás alapján kidolgozni a bizonyítást.

### 6. További megoldások hasonlóság alkalmazásával

Ezekben a megoldásokban párhuzamost húzunk valamelyik egyenessel, és egy kijelölt hasonlósági centrummal kapott hasonló háromszögek oldalainak arányára

vonatkozó egyenlőségeket írunk fel. (A párhuzamos egyeneseken egyenlő váltószögek vagy egyállású szögek keletkeznek.) Többféle lehetőségünk is van: a párhuzamost húzhatjuk valamelyik csúcsból, osztószakasz talppontjából vagy az osztószakaszok metszéspontjából; és amivel párhuzamost húzunk, az lehet az  $ABC$  háromszög valamelyik oldala vagy osztószakasza. (És természetesen ezeket a módszereket vegyesen is alkalmazhatjuk.)

**VIII. megoldás.** Párhuzamost húzunk a  $B$  csúcson át az  $AC$  oldallal, ennek az  $AP$  és  $CR$  egyenesekkel való metszéspontját jelölje  $D$  és  $E$  (9. ábra). A könnyebb leírás kedvéért vezessük még be az  $AZ = u$ ,  $ZP = v$ ,  $PD = w$  jelölést is.


A  $DPB$  és  $APC$  háromszögek hasonlóak, ezért  $\frac{w}{u+v} = \frac{r}{1-r}$  és  $DB = \frac{br}{1-r}$ .

A  $BRE$  és  $ARC$  háromszögek hasonlóak, ezért  $BE = \frac{b(1-r)}{r}$ .


Végül a  $DZE$  és  $AZC$  is hasonló háromszögek, innen

$$\frac{v+w}{u} = \frac{DB+BE}{AC} = \frac{r}{1-r} + \frac{1-r}{r}.$$

Ha az  $u$ ,  $v$ ,  $w$ -re kapott két összefüggésből kiküszöböljük  $w$ -t, akkor megkapjuk az  $\frac{u}{v}$  arányt. Az első egyenletből  $w = \frac{r}{1-r}(u+v)$ , a másodikból  $w = u \frac{2r^2-2r+1}{r(1-r)} - v$ , a jobb oldalak egyenlőségéből pedig, némi átalakítás után,  $\frac{u}{v} = \frac{r}{(1-r)^2}$  adódik.



9. ábra



10. ábra

Ugyanígy meghatározhatjuk a  $\frac{CZ}{ZR}$  osztásarányt is. Ha a  $CZ$ ,  $ZR$ ,  $RE$  szakaszokat rendre  $d$ ,  $e$ ,  $f$  jelöli, akkor a keletkezett hasonló háromszögekből

$$\frac{f}{e+d} = \frac{1-r}{r} \quad \text{és} \quad \frac{f+e}{d} = \frac{r}{1-r} + \frac{1-r}{r},$$

vagyis az előző megoldás  $\frac{u}{v}$  arányához képest  $r$  és  $(1-r)$  szerepet cserél. Az egyenletrendszerből kapjuk, hogy  $\frac{d}{e} = \frac{1-r}{r^2}$ .


Ha az  $AP$  és  $CR$  szakaszok osztásaránya már ismert, akkor a megoldás többféleképpen is befejezhető. Az osztószakaszok szimmetrikus szerepe miatt  $\frac{AX}{XP} = \frac{CZ}{ZR}$ , innen megkaphatjuk a korábbról ismert  $AZ : ZX : XP = r : (1 - 2r) : r^2$  arányokat (a levezetést az olvasóra bízjuk), és ez a másik két osztószakasz esetén is fennáll. Ekkor például rendre felírhatjuk a következő háromszögek területét (10. ábra):

$$\begin{aligned} T_{RCB} &= \frac{RB}{AB} T_{ABC} = \frac{1-r}{1} T_{ABC}; \\ T_{RBY} &= \frac{RY}{RC} T_{RCB} = \frac{1-2r+r^2}{r^2-r+1} \cdot \frac{1-r}{1} T_{ABC}; \\ T_{ZBY} &= \frac{ZY}{RY} T_{RBY} = \frac{1-2r}{1-2r+r^2} \cdot \frac{1-2r+r^2}{r^2-r+1} \cdot \frac{1-r}{1} T_{ABC}; \quad \text{végül} \\ T_{ZXY} &= \frac{XY}{BY} T_{ZBY} = \frac{1-2r}{1-r} \cdot \frac{1-2r}{1-2r+r^2} \cdot \frac{1-2r+r^2}{r^2-r+1} \cdot \frac{1-r}{1} T_{ABC} = \\ &= \frac{(1-2r)^2}{r^2-r+1} T_{ABC}. \end{aligned}$$


A további megoldásokat tehát visszavezethetjük két osztószakasz osztásarányának meghatározására.

**IX. megoldás.** Párhuzamost húzunk a  $P$  ponton át az  $AC$  oldallal, ennek az  $AB$  és  $CR$  egyenesekkel való metszéspontját jelölje  $D$  és  $E$  (11. ábra). A könnyebb leírás kedvéért vezessük még be az  $AZ = u$ ,  $ZP = v$ ,  $CZ = d$ ,  $ZR = e$ ,  $RE = f$  jelöléseket.

Próbáljuk meg önállóan befejezni.



11. ábra



12. ábra


**X. megoldás.** Párhuzamost húzunk a  $P$  ponton át a  $CR$  szakasszal, ennek az  $AB$  egyenessel való metszéspontját jelölje  $D$  (12. ábra). A hagyományos jelölésekkel  $AZ = u$ ,  $ZP = v$ ,  $CZ = d$ ,  $ZR = e$ , és legyen  $PD = g$ .

Az előző két megoldáshoz hasonlóan, a mellékelt ábra segítségével próbáljuk meg bizonyítani a feladat állítását.

**XI. megoldás.** Egy további, hasonló gondolatmeneten alapuló megoldás olvasható a cikkben.

### 7. További megoldások

Néhány olyan megoldási módszer következik, amiket a tanulók ritkábban alkalmaznak.



14. ábra

**XII. megoldás** (szabadvektorok). Dolgozhatunk szabadvektorokkal is. Legyen  $\vec{AB} = \mathbf{x}$ ,  $\vec{AC} = \mathbf{y}$ , és  $u, v, d, e$  jelentése a szokásos (14. ábra). Kétféleképpen is felírhatjuk az  $\vec{AZ}$  vektort.

Egyrészt  $\vec{AP} = \mathbf{x} + r(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ , így

$$\begin{aligned}\vec{AZ} &= \frac{u}{u+v} \vec{AP} = \frac{u}{u+v} (\mathbf{x} + r(\mathbf{y} - \mathbf{x})) = \\ &= \mathbf{x} \frac{u}{u+v} (1-r) + \mathbf{y} \frac{u}{u+v} r.\end{aligned}$$

Másrészt  $\vec{AR} = r\mathbf{x}$ ,  $\vec{RC} = \mathbf{y} - r\mathbf{x}$ ,  $\vec{RZ} = \frac{e}{e+d}(\mathbf{y} - r\mathbf{x})$ , és így

$$\vec{AZ} = r\mathbf{x} + \frac{e}{e+d}(\mathbf{y} - r\mathbf{x}) = \mathbf{x} \frac{dr}{e+d} + \mathbf{y} \frac{e}{e+d}.$$

Az

$$\mathbf{x} \frac{u}{u+v} (1-r) + \mathbf{y} \frac{u}{u+v} r = \mathbf{x} \frac{dr}{e+d} + \mathbf{y} \frac{e}{e+d}$$

vektoregyenlet helyettesíthető két skaláregyenlettel:

$$\frac{u}{u+v} (1-r) = \frac{dr}{e+d} \quad \text{és} \quad \frac{u}{u+v} r = \frac{e}{e+d}.$$

A két egyenlet hányadosából  $\frac{1-r}{r} = \frac{dr}{e}$ , innen  $\frac{d}{e} = \frac{1-r}{r^2}$ , azaz megkaptuk az egyik jól ismert összefüggést.

Vegyük az első egyenlet reciprokát:

$$\left(1 + \frac{v}{u}\right) \frac{1}{1-r} = \frac{1}{r} + \frac{e}{dr},$$

az előbb kapott összefüggés miatt

$$\left(1 + \frac{v}{u}\right) \frac{1}{1-r} = \frac{1}{r} + \frac{r}{1-r}.$$



Innen pedig  $\frac{v}{u} = \frac{(1-r)^2}{r}$ , mint korábban már láttuk.

A megoldás innen már (a korábbiakhoz hasonló módon) befejezhető.

*Megjegyzés.* Kicsit elegánsabb (egyszerűbb) lett volna a  $v = 1 - u$  és  $e = 1 - d$  jelölések alkalmazása; ekkor  $u$ ,  $v$  és  $d$ ,  $e$  a megfelelő szakaszok hosszának arányát jelentik.

**A XIII. és a XIV. megoldás** egyaránt helyvektorokkal dolgozik, az utóbbi súlyozott pontrendszer súlypontjának tulajdonságait használja fel. A megoldások a honlapon olvashatók.

**XV. megoldás.** Menelaosz tételét alkalmazzuk: Tekintsünk egy  $ABC$  háromszöget, és egy egyenest, ami a háromszög  $BC$ ,  $CA$ , illetve  $AB$  oldalegyenesét rendre az  $A_1$ ,  $B_1$ , illetve  $C_1$  pontban metszi. Ekkor az alábbi, előjeles szakaszok arányaira:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = -1.$$

Írjuk fel a tételt a  $BCR$  háromszögre és az  $AP$  egyenesre (16. ábra).

A tétel szerint ekkor (figyelmen kívül hagyva a szakaszok előjelét)

$$\frac{RA}{AB} \cdot \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CZ}{ZR} = r \cdot \frac{r}{1-r} \cdot \frac{CZ}{ZR} = 1, \quad \text{azaz} \quad \frac{ZR}{ZC} = \frac{r^2}{1-r}.$$

Majd írjuk fel a tételt a  $CAR$  háromszögre és a  $BQ$  egyenesre. A tétel szerint ekkor


$$\frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AB}{BR} \cdot \frac{RY}{YC} = \frac{r}{1-r} \cdot \frac{1}{1-r} \cdot \frac{RY}{YC} = 1, \quad \text{azaz} \quad \frac{YC}{YR} = \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Innen  $CY : YZ : ZR = r : (1-2r) : r^2$  könnyen adódik.


## 8. Észrevételek, általánosítás tetszőleges háromszögre és arányokra

**XVI.** (Általánosítás.) Korábban láttuk, hogy a  $\frac{T_{XYZ}}{T_{ABC}}$  arány kiszámításához elegendő az  $AP$  és  $CR$  szakaszok osztásarányát meghatározni. Észrevehetjük, hogy az  $AR = rc$  és  $BP = ra$  összefüggéseket felhasználó összes korábbi megoldásunk elvégezhető az  $AR = rc$  és  $BP = pa$  arányokkal is. Ebből pedig az következik, hogy tetszőleges  $0 < r, p, q < 0,5$  választás esetén is meghatározhatjuk a  $\frac{T_{XYZ}}{T_{ABC}}$  arányt (17. ábra).

A feladat tehát tetszőleges háromszögre, (majdnem) tetszőleges  $r, p, q$  paraméterekkel is megoldható. (Ez az ún. Routh-tétel: [https://en.wikipedia.org/wiki/Routh%27s\\_theorem](https://en.wikipedia.org/wiki/Routh%27s_theorem).)



16. ábra



17. ábra

**XVII.** Az alapfeladatban (szabályos háromszög, adott  $r$ )  $ABC$  és  $XYZ$  szabályos háromszögek voltak, tehát hasonlók is. Felmerül a kérdés, hogy tetszőleges háromszögben, adott  $r$  esetén öröklődik-e a hasonlóság. Ellenőrizzük, hogy ha az  $ABC$  háromszög derékszögű, de nem egyenlő szárú, akkor az  $XYZ$  háromszög nem derékszögű, így nem lehet hasonló az  $ABC$  háromszöghöz. A felmerülő kérdésre a honlapon lévő cikkben olvasható a részletes válasz.

## 9. Zárás

A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat összeállító tételkészítő bizottságnak – több szempontot figyelembe véve – mérlegelnie kell, hogy egy-egy feladatnak hány különböző megoldása kerüljön be az útmutatóba. A javítási útmutatónak több célja is van, és ezek közül csak az egyik a dolgozatok minél egyszerűbb, pontosabb és egységesebb kijavításának elősegítése. Az adott vizsgaidőszakban vizsgázók is elsősorban az útmutatóból tájékozódnak a lehetséges helyes megoldásokról, de ezen túl az útmutatónak szolgálnia kell a későbbi évfolyamok eredményes felkészülését is.

E célokból következik, hogy mindenképpen szerepeljenek azok a megoldások, melyek várhatóan sok dolgozatban fognak megjelenni. Sokszor szerepelnek olyan megoldások is, melyek csak kevés dolgozatban fordulnak elő, de valamilyen szempontból figyelemre méltóak, például különösen egyszerűek vagy elegánsak, „szépek”. Ugyanakkor nem szerencsés, ha az útmutató túl terjengős lesz a megoldások nagy száma miatt, el kell kerülni ezek öncélú szaporítását. A közölt megoldások ezért legyenek valóban lényegesen különbözőek. Az V. megoldás sokáig benne volt a tervezett útmutatóban, végül – tekintettel az utolsó említett szempontra – mégis kikerült belőle, hiszen alapelveit tekintve sokban hasonlított a III. megoldásra, így kevés újat mond, ötödikként talán túlzás lett volna szerepeltetni.

Végül még egy érdekesség: ez a feladat tulajdonképpen a 2017. májusi emelt szintű feladatsor 8/b. feladata<sup>4</sup> „ikerfeladatának” is tekinthető. Ott a szabályos háromszög szögeit, itt az oldalait osztottuk egyenlő részekre. Mindkét feladatra sok,

<sup>4</sup>[https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok\\_2017tavasz\\_emelt/e\\_mat\\_17maj\\_fl.pdf](https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2017tavasz_emelt/e_mat_17maj_fl.pdf)

változatos megoldás készíthető, melyek a geometria számos szépségét felvonultatják. A javítási útmutatóba ezek közül akkor is csak néhány kerülhetett bele, ezért aztán az a feladat is a KöMaL-ban élt tovább<sup>5</sup>.

### A matematika érettségi tételkészítő bizottság

## Gyakorló feladatsor emelt szintű matematika érettségire



### I. rész

1. Egy háromszög csúcsai a derékszögű koordináta-rendszerben  $A(-1; 4)$ ,  $B(7; -2)$  és  $C(5; 8)$ .

a) Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a  $C$  ponton és a háromszöget két egyenlő területű részre osztja. (4 pont)

b) Számítsuk ki, hogy az  $y$  tengely melyik pontjából látható derékszögben az  $AB$  szakasz. (6 pont)

2. a) Oldjuk meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet:

$$|x - 2|^{2x^2 - 11x + 14} = 1. \quad (6 \text{ pont})$$

b) Oldjuk meg az 1-nél nagyobb egész számok halmazán az alábbi egyenletet:


$$7 \cdot \binom{n}{2} = 2 \cdot \binom{n+2}{3}. \quad (7 \text{ pont})$$

3. Egy céllövöldében az ábrán látható módon felfüggesztettek hat különböző színű lufit. Azt a szabályt vezették be, hogy csak arra a lufira szabad lőni, amelyek a két felfüggesztés bármelyikében éppen legalul van.

a) Hány különböző sorrendben lőhető le a fenti szabály szerint a hat lufi? (5 pont)

Ebben a céllövöldében egy nyolcfős társaság szórakozott, ahol az első öt személy 3, 1, 5, 2 és 3 lufit talált el.

b) Hány lufit talált el a maradék három személy külön-külön, ha a társaság találatainak átlaga 3, mediánja 2,5 lett? (5 pont)



Nagyszámú megfigyelés alapján megállapították, hogy 0,4 annak a valószínűsége, hogy egy céllövő elsőre eltalálja a kiszemelt lufit.

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a céllövő 6 lövésből legalább 5 lufit eltalál? (4 pont)

<sup>5</sup><http://db.komal.hu/KomalHU/showpdf.phtml?tabla=Cikk&id=201959>  
(KöMaL, 2017. november)