

Iovakban

PEGAZZUS

A LOVÁKOK LAPJA

FÁJDALOMSKÁLA



Fito Cavallo

A ló fájdalomnak jelei az állat arc kifejezésén (grimaszok és fültartás), valamint kénytelenségén megfigyelhetők. Ezek alapján a fájdalmak erősségében és intenzitásában több fokozatot különböztethetünk meg.

INFO



FÁJDALOMARC



rincs fájdalom



enyhe fájdalom



erős a fájdalom

A FÁJDALOM FOKOZATAI

A Colorado Egyetem belső használható segédlete az ún. **ötpontos FÁJDALOMSKÁLA**, mely állatorvosoknak, lovas szakembereknek és maguknak a lovasoknak egyaránt hasznos eszközt jelenthet a fájdalom erősségének egységes megjelölésében.

1. színi – ENYHE FÁJDALOM

Visszaugrások, de nem nyugtalan vagy
bőltől forduló

0. színi – NINC S FÁJDALOM

Élénk, de nem nyugtalan

felkészültségű állatot tart

Figyel az emberre

Putrozás, ingerítkezésre normál

élettérjű, nem bonyol

Mozgáskészlet, rugalmas, nem kórtól

Féltékeny, az állat egy részét nem megérinti

fején (magyarul) a nyak hátsó részén

4. színi: kénytelenül, kénytelenül, kénytelenül, kénytelenül, kénytelenül, kénytelenül

ÉLETTANI ALAPÉRTÉKEK

TRUKK

Rektális hőmérséklet: 37,5 - 38,3 °C

Pulzus: 32-44/perc*

Légvétel: 6-16/perc*

Nyálkahártya rózsás, habos, tapintható

Kapilláris feltöltési idő (CRT): 1-2 másodperc

Bőrszín: folyamatosan változó

CIKÓ

Rektális hőmérséklet: az első előny

napközben emelkedett, majd a hőmérséklet

del el a hirtelen. Szélesség: 38,3-38,7 °C.

Pulzus: 60-110/perc**

Légvétel: 20-40/perc**

* munkavégzésnek megfelelően

** a ló hőmérsékletének alapján

