

A *Discus Ruderatus* (FÉRUSSAC,1821) bükki előfordulása

Domokos T.

Occurence of *Discus ruderatus* (Fer. 1821.) in the Bükk Niuntains (North Hungary)
Author reports a new, recent occurrence of *Discus ruderatus* from a medium high mountain ranges area.

A 80-as években végzett Bükk-kutatás során vizsgáltam a Hór vízgyűjtőjéhez tartozó tebepusztai forrást, patakot és tározót.

A forrás vizének hőmérsékletét tavasszal 5 °C-nak, vízhozamát csupán 1 dm³/min értéknek találtam. A tenger szintje felett közel 400 m magasságban eredő forrás kis patakjához égeres foltocska kapcsolódik. Az égeres avarjából vett mintában 1988 áprilisában meglepetésemre két db *Disdus ruderatust* találtam, melynek recens voltát későbbi gyűjtések is igazolták. (Közismert, hogy a pleisztocén löszökben is előforduló fajról van szó.)

A magyarországi recens puhatestűek elterjedésében (Pintér L.–Richnovszky A.–S. Szigethy A., 1979.) e fajnak csupán négy előfordulási helye kerül említésre (Börzsöny: Csóványos, Mátra: Szamár-kő, Galyatető, Kékes). Ezek mindegyike 700 m felett található. A bükki előfordulás tehát – jelenlegi ismereteink szerint – az area-peremi foszlányok közül a legalacsonyabban fekvő egységet képviseli Magyarországon. A *Discus ruderatust* kísérő 23 tagú malakofauna:

<i>Carychium minimum</i>	<i>Vitrina pellucida</i>
<i>Cochlicopa lubrica</i>	<i>Zonitoides nitidus</i>
<i>Cochlicopa lubricella</i>	<i>Vitrea crystallina</i>
<i>Cochlodina laminata</i>	<i>Aegopinella pura</i>
<i>Macrogastera ventricosa</i>	<i>Nesovitrea hammonis</i>
<i>Clausilia cruciata</i>	<i>Euconulus fulvus</i>
<i>Laciniaria plicata</i>	<i>Bradybaena fruticum</i>
<i>Balea biplicata</i>	<i>Perforatella bidentata</i>
<i>Vestia turgida</i>	<i>Perforatella incarnata</i>
<i>Succinea oblonga</i>	<i>Trichia hispida</i>
<i>Punctum pygmaeum</i>	<i>Euomphalia strigella</i>

Helix pomatia

Irodalom

Pintér L.–Richnovszky A.–S. Szigethy A. (1979): A magyarországi recens puhatestűek elterjedése. – *Soosiana* (Suppl. I.)

